

# FANGA 777 SG

Glyphosate 777 g/Kg  
Herbicide systémique non sélectif



Avant



Après

Fabriqué par:  
ZHEJIANG LINGHUA  
INDUSTRIAL Co. Ltd.  
LINGHU, HUZHOU,  
ZHEJIANG, PR CHINA




Distribué par:  
VOLCAGRO  
Côte d'Ivoire  
01 BP 10398 Abidjan 01  
tél. (225) 21 28 60 06  
volcagro@avisoci

N° du lot:

Date de fabrication:  
Date de péremption:

N° d'homologation: 09 0886 He

Poids net: 1 Kg



**ATTENTION**



## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tenir le produit à l'écart des denrées alimentaires et hors de portée des enfants et des animaux.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux
- Porter des vêtements et du matériel de protection
- Ne pas inhaler le produit
- Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'application du produit
- Se laver soigneusement à l'eau et du savon après traitement
- Détruire les emballages vides
- Conserver le produit dans son emballage d'origine

## PREMIERS SECOURS

Contacteur un médecin de toute urgence en cas d'intoxication

## ANTIDOTE

Pas d'antidote spécifique. Traitement symptomatique

## GARANTIE ET RESPONSABILITE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés aux cultures, à l'environnement, aux hommes et aux animaux du fait d'une mauvaise utilisation et du non respect des recommandations d'usages.

Notre responsabilité est limitée à la fourniture de produits conformément aux spécifications sur l'emballage.

## MODE D'EMPLOI

**FANGA 777 SG** est un herbicide systémique non sélectif agissant par absorption foliaire. Il est extrêmement efficace sur les Monocotylédones (particulièrement sur les espèces à rhizomes et bulbes tels que *Cyperus spp* et *Imperata cylindrica*) et les Dicotylédones d'où son utilisation comme débroussaillant avant la mise en place des cultures. (coton, riz maïs, cultures maraîchères et autre vivriers).

**FANGA 777 SG** est efficacement utilisé pour l'entretien des plantations de cacaoyers, de caféiers, de palmiers à huile, d'hévéa, de cocotiers, des arbres fruitiers et de terrains vagues...

## PERIODES DE TRAITEMENT

Appliquer le produit lorsque les adventices sont vivaces, et seulement sur tiges aoûtées des cultures.

## DOSES D'APPLICATION

- Mauvaises herbes annuelles: 1 à 1,5 kg/ha selon le taux d'infestation
- Mauvaises herbes pérennes en émergence: 2 kg/ha
- Mauvaises herbes pérennes à maturité: 2,5 à 3 kg/ha
- Mauvaises herbes à rhizomes ou à bulbes: 3 kg/ha

## VOLUME DE BOUILLIE

50 à 200 l/ha selon le type d'appareil utilisé.

**Délai de carence:** Sans objet



**ATTENTION**

